

四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

普濟方卷二百八

詳校官太醫院院使臣張肇基

編修臣倉聖脈覆勘

總校官庶吉士臣何思鈞

校對官中書臣石鴻勳

謄錄監生臣張五誥

欽定四庫全書

普濟方卷二百八

明

周王朱櫛撰

泄痢門

諸瀉

附論

夫有脾瀉有腎瀉脾瀉者肢體重著中脘有妨面色虛黃腹肚微滿腎泄者膚膝怯冷腰脊酸疼上咳面顴臍腹疼痛治脾瀉用蒼朮白朮厚朴乾薑木香生薑薤白治腎泄用補骨脂及安腎丸震靈丹輩

方

參連丸

治腸胃虛弱冷熱不調泄瀉腸鳴日夜無度

艾葉

用糯米糊拌勻焙取細末秤二兩半

乾薑

炮取末二兩用艾末米醋一升半慢

火熬

成膏

訶子

煨去核一兩

宣連

一兩半剉如麻豆大用吳茱萸一兩半同

黃連炒色紫揀

去茱萸不用

人參

去蘆

白朮

木香

一兩半別用黃

連一兩等為麤末將木香浸水一升

慢火煮盡水去黃連不用切焙乾

烏梅

去核焙乾

秤

百草霜

別研

白茯苓

去皮

酸石榴皮

炒

當

歸

洗焙各一兩半

赤石脂

一兩三分

龍骨

一兩三分火煨

地榆

一兩
半

阿膠

二兩
伴粉炒

罌粟

二兩
蜜炙

右為末將前項艾膏和為丸如梧桐子大每服五十
丸陳米飲下

欽腸丸 治久瀉

木香 丁香

附子

炮去
皮臍

縮砂仁

訶子皮

罌粟殼

炒去
頂穰

川薑

炮

沒石子

梓州厚朴

薑
製

白龍骨

赤石脂

炮

肉苳菴

麵包
煨

禹餘糧

醋淬七遍已
上各一兩

右為細末麵糊丸如桐子大每服七十九米飲下空心食前

荳蔻燥腸丸 治沉寒痼冷泄瀉冷痢腹疼後重

附子

炮去皮

赤石脂

各一兩

肉荳蔻

麵裹煨

良薑

切炒

乾薑

炮

舶上硫黃

各半兩

右為細末醋糊為丸如梧桐子大每服三十九米飲下

太聖散 治脾胃積寒心腹疼悶臟腑泄瀉腸鳴絞痛

益智

皮 三兩 連炒

川烏頭

皮 炮裂去臍

陳皮

湯浸去白 各一兩

乾薑

炮裂 半兩

茴香

七錢 炒

甘草

二錢 炙

右為細末每服二錢水一盞入鹽一捻同煎至七分

去滓食前熱服

加訶子四柱散 治臟腑虛怯本氣弱脾胃不快不進

飲食時加洩瀉晝夜不息

人參

去蘆

白茯苓

去皮

附子

炮去皮臍 各一兩

木香

紙包

煨過

訶子

濕紙包取 皮用半兩

右為細末每服二錢棗一枚生薑三片煎至六分溫服一方加荳蔻一方有白朮真陽耗散兩耳常鳴臍腹疼痛頭旋目暈四肢急倦脾胃不和晝夜泄瀉痢小便滑數

止泄瀉煖脾去僣散

以陳廩米作湯食之

肉荳蔻散

治脾胃氣虛腹脇脹滿水穀不消臟腑滑

瀉腸內虛鳴困倦少力口苦舌乾不思飲食日漸瘦弱

蒼朮

米泔浸一宿
去皮尖八兩

茴香

炒

肉桂

去麋皮

川烏

炮去
皮刺

訶子皮

各二兩

乾薑

厚朴

去麋皮
薑炒

陳

皮

去白

甘草

燻

肉苳蔻

麋累煨
各四兩

右為末每服水一盞生薑三片棗一枚煎至七分溫

服

寶腸散

出直
指方

治泄瀉不止

肉苳蔻

訶子

炮

縮砂仁

陳皮

蒼朮

炒

茯苓

各一兩

木香

半兩

甘草

四錢

川厚朴

製一兩半

右吹咀每服三錢薑棗煎服手足冷者加炒乾薑

九寶飲子

出醫方集成

治分利水穀止泄瀉

瞿粟穀

蜜炙

青皮

陳皮

木通

各一兩二錢

赤茯苓

苓

去皮

黃芪

微炒

厚朴

薑製

粉草

車前子

畧炒各二錢

半錢

右吹咀每服三錢水一盞煎至七分溫服

葦撥丸

出百一選方

治滑泄妙甚

附子

炮去皮臍

葦撥

川薑

丁香

不見火

吳茱萸

炒

良薑

胡椒

已上各一兩

山茱萸

去核

草薺

去皮

半兩

右為末棗肉丸梧桐子大每服五十丸食前陳米飲下日五服廬州知鍊周汝功嘉禾人乃尊守永嘉時每苦滑泄服此藥果有效其方董發運問有序多不復錄上二方亦周糾所傳也如瀉日三服下

補脾丸

出百一還方

治滑泄不禁

白朮

赤石脂

肉苁蓉

麝香

川厚朴

去麋皮薑汁塗炙

川白薑

炮各一兩

葷撥

炒

神麴

炒

附子

炮去皮臍

麥蘖

炒半兩

右為細末醋糊為丸如梧桐子大早晚食前各五十

丸陳米飲下

縮砂丸

出御藥院方

治大便泄瀉米穀不化腹中疼痛不

思飲食

縮砂仁

黃連

去鬚微炒

附子

炮去皮臍

吳茱萸

湯洗七次

焙乾微炒

訶子皮

肉苳菴

各二兩

乾薑

炮

木香

各半

兩

右為細末水煮麵糊丸如梧桐子大每服五七十九

食前米飲下

肉苳蔻丸

出和
制方

治泄瀉療脾胃氣虛弱飲食減少

訶梨勒皮

龍骨

木香

各三
分

丁香

三
兩

肉苳

蔻

縮砂仁

各一
兩

赤石脂

白礬

枯各
半兩

右件藥搥羅為末粟米飲和搜丸如梧桐子大每服

二十九米飲下不拘時

厚腸丸

出百一選方

治泄瀉不止

白龍骨 乾薑

附子

炮去皮臍

厚朴

薑製

訶子

炮去

枝

肉苳菴

麵裹煨

陳皮

右等分為末酒糊丸如梧桐子大每服五十九米飲下

羊肉扶羸丸

出三因方

治脾胃不和不進飲食臟腑虛滑

老人虛人尤宜服

精羊肉

一斤半微斷血脉焙乾取末四兩

川椒

去目炒出汗

肉苳

菴

各環一兩

白薑

炮一兩

木香

一分

附子

炮去皮臍

神

麴

炒半兩

右為末煮粟米飲為丸梧桐子大食前米湯下五十

丸

荳蔻分氣飲

出三因方

治臟腑虛寒洩瀉瘦極及婦人產

後洞洩危篤者

藿香葉

草荳蔻仁

青皮

各四兩

甘草

炙

丁

香

各半兩

肉荳蔻

炮十兩

烏梅

五十箇去仁

右吹咀每服四錢水二盞糯米一撮煎七分去滓空心服

治大瀉後腹中空竭胸中虛滿不下飲食

芍藥 甘草 半夏 厚朴 當歸 桂心

各三兩 生薑 五兩

右吹咀以水八升煮取三升分三服服二劑最佳

葶藶固腸丸

出御藥院方

治脾胃虛弱臟腑頻滑不思飲

食腸鳴腹痛

木香 赤石脂 乾薑 縮砂 厚朴 生薑 肉

荳蔻

麵裹煨去
麵各一兩

右為細末麵糊為丸如梧桐子大每服六十九食前

米飲下

麴朮丸

出衛生
寶鑑

治時暑暴瀉壯脾溫胃進美飲食及

療飲食所傷胸膈痞悶等積服此取效

神麴

炒

蒼朮

米泔浸一宿焙
乾各等分為末

右為細末麵糊為丸如梧桐子大每服四十九不拘

時米飲下

神翅九

一名斷下丸
出百一選方

治暴瀉不止

神翅

二兩
炒

茱萸

半兩湯泡七
次却砂乾

右為末用醋糊丸如梧桐子大每服四十九米飲下

食前服

通苓散

出危
氏方

分利水穀解煩熱止泄瀉

豬苓

去
皮

白朮

去
蘆

澤瀉

去
毛

赤茯苓

去
皮

木通

茵陳

瞿麥

車前子

右剉散每服四錢水一盞半燈心麥門冬煎服

木香散

出危氏方

治脾胃俱虛泄瀉

肉苳蔻

麴糵

煨

破故紙炒

白朮

木香

甘草

白茯苓

各半兩

右剉散每服三錢生薑三片棗二枚食前溫服

百粒丸

治遠近久便大腸滑神効

紅椒

胡椒

附子

丁香

乾薑

麥蘖

右各等分為細末醋煮大蒜為丸每服百粒用米飲

湯下

椒紅固腸丸

出瑞竹堂方

治脾胃積冷腸鳴大便滑泄腹

痛

神麴

六兩作小塊炒香熟

白朮

一兩剉炒乾

肉苳菹

三兩麴糵

川薑

去皮炮三兩

厚朴

去麁皮薑一兩

川椒

去目炒去汗取乾淨

一兩半

右為細末別用蒜不拘多少濕紙裹煨香熟剝淨研如泥熱湯化開濾去滓少入麴打糊搜藥丸如梧桐

子大每服七八十九空心米飲湯送下日進二服

立効散 治瀉

烏梅肉 御米穀 白礬 甘草 炙 夜叉頭

右各等分為末每服二錢半米飲湯調空心服

治瀉

出百一
選方

人參 去蘆

茯苓

肉苳蔻 麵裹煨

訶子肉 等分

木

香

減半

右為末丸如梧桐子大每服三五十九米飲湯下小

兒服九如黍米大量大小加減服之

治脾泄多年老人腎虛謂之水土同化

出存
仁方

用吳茱萸簸淨不拘多少白水煎去滓蓋內入鹽少許通口服蓋茱萸能煖膀胱水道既清大腸自固餘藥雖熱不能分解清濁也

建脾散

一名養婆湯
出三因方

治五泄或清白五色雜下休作

無時亦治脾胃虛損臟腑泄瀉不進飲食寒中洞泄及年高久泄不止

烏頭

炮去皮
尖三錢

厚朴

去皮剉
薑製炒

甘草

炙

乾薑

一炮

分

右為末每服二錢水一盞薑五片棗二枚煎至七分
熱服一方無棗煎

四神丸

出醫方
集成

治脾泄腎泄

肉苳蔻

生二兩

破故紙

炒四兩

木香

半兩不
見火

茴

香

炒一兩

右為末生薑煮棗肉丸如梧子大鹽湯下一方去木

香茴香入神麴麥蘖如前作丸

木香煑散

出百一
選方

治瀉不止

木香

二兩

甘草

半兩
炙

茱萸

二兩
去枝梗

罌粟殼

去頂

蒂膜蜜

炙四兩

右咬咀每服三錢水一盞半煎至一盞去滓食前稍

溫服

桃花丸

治男子婦人泄瀉不止

良薑 赤石脂 乾薑 五靈脂

右等分為末醋糊為丸如梧桐子大每服三四十丸

米飲湯下

荳蔻飲

一名荳蔻散
出百一選方

治滑泄神効

陳米

一兩

肉荳蔻

麵裹煨

五味子

赤石脂

研各半兩

右為末每服二錢粟米湯飲調下日進三服

麴蘗丸

出危氏方

治脾胃中風澁臟腑泄滑不止

芡蘗

神麴

炒

白朮

附子

炮去皮臍尖各等分

右為細末用糊丸如梧桐子大每服三五十丸空心

米飲下左氏述楚子圍蕭將潰無社告申叔展曰有
麴麥乎有山麴乎鞠窮芴窮也意欲令逃水中以避
禍是知芴窮能除濕予嘗加朮附以製方治脾濕而
泄者無有不中此藥亦治殭泄素問曰春傷於風夏
必殭泄者食穀不化蓋春木旺時肝生風邪淫於脾
經至夏飲冷當風故多殭泄此藥尤宜

朝真丹 治腸胃虛弱內受風冷或飲食生冷內傷脾
胃泄瀉暴下日夜無度腸鳴腹痛手足厥冷

硫黃

生研細
三十兩

朱砂

研為末
三兩一錢

白礬

煨七
兩半

右研勻水浸蒸餅丸如梧桐子大用朱砂為衣每服
三十丸溫米飲下不計時夏月宜備急

棗肉丸

出濟
生方

治脾胃虛寒或腸鳴泄瀉腹脇虛脹或

膈不快食不化

破故紙

四兩
炒

木香

不見火
秤一兩

肉苳蔻

三兩麵裹
煨香去麵

不用

右為細末燈心煑棗為丸如梧桐子大每服七十九

用生薑湯下空心食前服

如神九

出三因方

止瀉治臟腑虛寒脾胃受濕泄瀉無度

腸鳴腹痛不進飲食漸至羸瘦並宜服之

川烏頭

四兩米泔浸軟去皮切作片子用鹽四兩炒黃去鹽不用

半夏

湯洗七次

去滑

蒼朮

米泔浸淨洗各半斤

右為末薑汁糊為丸如梧桐子大每服五六十丸空

心米湯下

戊己丸

一名苦散海上名方

治冷熱不調泄瀉不止米穀不化

臍腹刺痛脾受濕氣毒不利

黃連

去鬚

芍藥

吳茱萸

去梗湯浸各等分

右將黃連芍藥微炒黃次下茱萸炒深黃色為末水糊丸如梧桐子大每服三十丸米飲下日二三服不拘時一方水浸蒸餅為丸良方作散末用水煎治痢疾一方麵糊為丸一方醋糊為丸一方粥飲調下

香薷丸

出危氏方

治飲多遂成酒泄骨立不能食但再飲

一二盞泄作幾年矣

嫩鹿茸

以火燎去毛酥炙黃

肉苴菹

煨火

生麝香

別研

右為末白陳米飲為丸如梧桐子大每服五十丸空

腹米飲下熱者酒蒸

黃連丸

固腸丸

一名茱連丸出百一選方

治臟腑滑泄晝夜無度

吳茱萸

揀淨

黃連

去鬚

罌粟殼

去穢蒂三味各等分

右為末醋糊丸如梧桐子大每服三十丸空心米飲

下赤痢甘草湯下白痢乾薑湯下赤白痢甘草乾薑

湯下

乳豆丸

出瑞竹堂方

治臟腑泄瀉不調滑泄不止諸藥罔

効

乳香

一兩別研

肉苳蔻

二兩麴糵煨熟取苳蔻切碎另研為末

右為細末相和用陳米粉糊為丸如梧桐子大每服五七十丸空心米飲湯下乙方乳香用酒浸透研成膏肉苳蔻生用為丸一方用肉苳蔻大一枚剉小竅入乳香三分塊麴糵煨熟去麴為末米飲下一方以茶末對烹之

肉附九

一名豆附散
出百一選方

治腹瀉不止

肉苳菹

一兩一錢
麵裹煨

附子

一箇重七錢
者炮去皮臍

右為細末粉糊為丸如梧桐子大候乾每服五六十

丸米湯吞下不拘時立效一方薑五片煎服空心下

神授丸

出百一
選方

治臟腑

南木香

二錢
半

肉苳菹

一兩麵
裹煨

右為末煑棗為丸如梧桐子大每服三五十丸米飲

下不拘時

香薑散

治晨泄又名瀼泄久患脾泄瀉兼卒下痢一

名委薑散一名薑黃散

生薑

四兩切
如豆大

黃連

二兩
剉

右一處淹一宿慢火炒薑紫色去薑不用將黃連為末每服二錢用蠟茶清調一劑而愈或薑作末米飲酒調治白痢方二方呔咀水五升煮一升頓服不拘時候若欲速效一料只作兩服常有患此兩服愈

肉苳菟丸

治腎洩久不愈脉沉細無力者及脾胃虛

弱泄瀉不止全不進飲食一名二神丸

破故紙

炒

肉苁蓉

麵裹煨
各等分

右為末棗肉為丸如梧桐子大每服五七十丸米飲下空心服一方用肥棗四十九箇生薑四兩切片同煮爛去薑取棗皮核研如膏入藥同杵丸鹽湯下弱甚加茯苓二兩木香一兩有人全不進食服補脾藥皆不效予授此方服之遂頓然能食此病不可全作脾虛蓋腎氣怯衰弱真元衰劣自是不能消化飲食

譬如鼎釜之中置諸米穀不無火力雖終日米穀不
熱其可能化黃魯直嘗記服兔絲子淨淘酒浸曝乾
日炒數匙酒下十日分飲噉如湯沃雪亦如此理也
香蘓湯治下後煩氣暴上

生蘓

一把冬用蘓
子三兩重

香豉

五兩

右以水五升煮取二升頓服之

治臟腑

用鷹爪黃連不以多少碾為細末煨熟去皮大蒜九

如梧桐子大每服三十九或五十九米飲下

火欬丸 治風氣行於腸胃泄瀉

用火欬草一味為末醋糊丸每服三十九空心下

治瀉久効者老人尤宜服一名護命方

用大附子一箇炮去皮臍以韭菜根研爛絞取汁丸
如梧桐子大晒乾每服三十九米飲湯下不乾恐麻
人一方治一切冷瀉出後頻仍面無顏色不思飲食
杵為末以一錢煮粥一碗空心食

椒附湯 治驟腹疼注下或滑腸頻多有冷沫

川椒

去目

乾薑

生用

附子

去皮臍生用
三味各等分

右為麤末每服三錢水二盞煎至八分溫服不拘時
治夏秋暑瀉不止

以理中湯下駐車丸

胃苓散 治瀉傷暑煩渴引飲所下如水

用平胃散五苓散各二錢水一盞棗二枚薑三片煎
至七分嚼薑棗和滓嚥服少刻又服辰砂五苓散亦

可用來復丹亦可或寒濕水泄正胃散理中湯蘇梅
米湯調下一方入鹽煎

藿香正氣散 治飲食中憂怒傷脾腸腹內膨滿泄瀉
頻併或作晨泄加丁香縮砂良薑南木香各半錢生
薑三片紅棗二枚煎服効

治泄瀉

用鷄蛋一箇去尖頂用白礬些少火上飛乾入於鷄
子內銀鑽勻將濕紙裹着火上煨熟服之

治泄瀉不止腿脚無力行步艱難

宜服丁香五套丸立止

治泄瀉

用敗毒散加陳糯米五十粒煎服亦治噤口痢熱毒
冲心不進飲食噤口或有熱加蓮肉

治泄瀉臟寒不進飲食氣體倦怠名猪臟丸

用吳茱萸不以多少揀淨用猪臟一兩條以茱萸
實滿扎定兩頭熟炭煑令極爛研細丸如梧桐子大

早晚食前各以飲吞下至五十丸

棗附丸 治臟腑寒滑泄不思飲食

用正生大附子一箇乾棗半斤同銀石器中慢火煮
上留水兩指末乾旋添湯煮兩三時取出切作薄半
箇再煮候至晚棗丸如梧桐子大空心米飲下三四
十丸患滑泄垂死者皆愈

治夏月脾胃厥冷滑腸洩瀉肚痛及霍亂吐瀉不止

用胡椒不拘多少為末研爛飯搜和手心揉勻丸如

梧桐子大每服三四十粒陳米飲吞下

炙肝散

一名猪肝散

治久患脾泄不愈及瀉不止

白朮

白芷

白芍藥

各半兩

桔梗

一分

右各生為細末以不入水獺猪肝五兩作小片子或塊子藥一十五錢細切葱白二寸鹽一錢同拌肝令勻以竹簽子作串慢火炙香熟啖之米飲送下空心食前各一服渴勿喫冷水半月必安

朴附九

出危氏方

治脾元虛弱久患脾泄冷瀉不止及翻

胃惡心臑腑滑泄痢下

厚朴

去蘆皮薑汁製一兩

綿附子

炮去皮臍淨一兩

神麴

炒三錢

乾薑

炮三兩一用生薑六兩取汁

右為末酒煮麴糊丸如梧桐子大每服三十丸空心

食前米飲或鹽湯下一方無神麴用橘紅

加味治中湯

出危氏方

治脾胃不足飲食不節過食生冷

腸鳴痛泄瀉注下身體怯寒

乾薑

炮

白朮

青皮

縮砂

各一兩用仁

人參

去蘆

甘草

炙各半兩

右呖咀每服四錢水一盞半生薑五片棗一枚煎至七分去滓溫服不拘時或進感應丸

粟殼丸

出危氏方

治暴瀉

肉苳蔻

炮

粟殼

去赤臉蒂
萆淨炙

右為末醋糊丸如梧桐子大空服米湯下三十九

訶梨勒散

出聖惠方

治老人瀉不止

訶梨勒

三分煨用皮

白礬

一兩燒灰

右搗細羅為散每服不計時候以粥飲調下二錢

穀神散

出百一選方

治夏月暴瀉

甘草

炙

乾薑

各一兩

陳倉米

楮實

青者蒸一
次晒乾用

一斤

右為細末飯飲調下

朴附丸

治脾胃久虛穀腸滑泄臍腹絞痛腸鳴泄瀉

肢體無力此藥補益脾胃止心腹撮痛溫胃進食

厚朴

五兩去麤皮剉塊子

附子

一兩半剉大塊去皮臍

生薑

五兩不去

皮淨洗

切片子

青州棗

一百箇先將四味用水五升一處煮候水盡揀出棗子外將其

餘三味焙乾與後藥同末

乾薑

炮去皮一兩

訶子

一兩炮

肉苳

薤

一兩

人參

一兩

右為末將棗去皮核和藥為丸如梧桐子大每服三十丸早晚食前用陳米飲下

訶子丸

出本
草方

治脾胃不和泄瀉不止諸藥不効

訶子皮

川薑

肉苳薤

龍骨

木香

赤石

脂

各等分

右為細末糊丸如梧桐子大每服四十九水飲下一

方有附子

吳茱萸丸

出御藥院方

治一切積冷脾胃不和心腹疼痛

嘔吐泄瀉腹內絞痛

吳茱萸

洗七次焙乾半兩

良薑

剉研

乾薑

炮各五兩

右各修製畢搗羅為細末醋打麵糊為丸如梧桐子大每服五十九空心食前溫粥飲下

三宜湯

出和劑方

治胃暑引飲冷熱不調泄瀉多渴心腹

煩悶痢下赤白腹痛後重

桂心

四斤

乾薑

炮炒
四斤

甘草

砂炒
三斤

杏仁

去皮

尖砂炒四斤
四兩另研

右為末每服一錢沸湯點服如傷暑煩渴新水調下

不計時

來復丹

出醫方
集成

治伏暑泄瀉

方見中
暑類

理中湯

出醫方
集成

治臟腑停寒泄瀉不止

方見脾
臟門

藿香正氣散

出醫方
集成

治感濕泄瀉

方見傷寒
門雜治類

南白膠香散

出衛生寶鑑

治脾寒虛滑腸久瀉臍脹無休

粟穀

去鬚蒂四兩醋炒

南白膠香

龍骨

各三分

甘草

炙七錢

乾薑

半兩炮

右為粗末每服五錢水一盞半煎一盞去滓溫服

金鎖正元丹

出醫方集成

治腎虛泄瀉小便頻數盜汗遺

精虛冷之証並宜治之

五倍子

茯苓

各八兩

龍骨

煅別研

硃砂

別研各三兩

紫巴戟

去心十六段

補骨脂

酒浸炒十兩

肉蓯蓉

洗焙

葫蘆巴

炒研各一斤

右為末入研藥令勻酒糊丸如桐子大每服三十九
空心溫酒鹽湯任下

白朮丸

出楊氏家藏方

治泄瀉吐嘔脾胃不和痰多氣逆

白朮

半夏麴

乾薑

炮

人參

去蘆頭四味各四兩

丁

香

半兩

高良薑

油炒半兩

右件為細末生薑汁煮麵糊為丸如梧桐子大每服
五十九溫米飲食前下

治腸丸

治腸胃虛濕泄瀉頻併米穀不化腹脹腸鳴臍

腹痛腸滑洞下

黃連

去驢

乾薑

炮

肉苳菹

麤麤煨香

赤石脂

龍

骨

吳茱萸

湯洗微炒已上六味各半兩

訶子

煨去核一兩半

右為細末粳米飯為丸如梧桐子大每服三十九米

飲下空心食前服

茱萸已寒圓

治臟腑久弱腸胃宿寒泄瀉頻併

青橘皮

去皮二兩

陳橘皮

去皮二兩

附子

炮去皮臍

川烏

頭

炮去皮
臍尖

乾薑 炮

高良薑

吳茱萸 炒
黃

肉

桂

去粗皮已上
六味各一兩

右為細末醋煮麵糊為丸如梧桐子大每服三十九
至五十九米飲下

實腸丸 治腸胃虛弱腹脹泄瀉時時刺痛

黃連

一兩
去鬚

肉苳蔻

麵裹
煨香

丁香

乾薑

炮

白

茯苓

去
皮

當歸

洗焙
乾

訶子

去核六味
各半兩

木香

一分

右件同為細末用猪膽汁煮麵糊為丸如梧桐子大

每服五十丸食空米飲下

養臟丸 治腸胃虛寒泄瀉無度不進飲食

生硫黃

四兩
研粉

乾薑

炮

附子

炮去
皮臍

山藥 鹿

角霜

肉苳蔻

麵裹煨香已上
五味各三兩

右為細末以麵糊為丸如梧桐子大每服三十九丸漸加至五十丸空心食前溫米飲下

黃連烏梅丸

治飲食不節榮衛不和風邪進襲腑臟

之間致腸胃虛弱泄瀉腸鳴腹脇膨脹裏急後重日

夜頻併不思飲食

黃連

去鬚

阿膠

蛤粉炒成珠子

當歸

洗淨三味各二兩

人參

去蘆頭

龍骨

紅燉

赤石脂

乾薑

炮

白茯苓

去皮

烏梅肉

焙乾

陳橘皮

去白

訶子

煨去皮臍

肉苳蔻

麵裹煨香

木香

罌粟殼

蜜炙已上十味各一兩

白礬

枯半兩

右為末醋煮麵糊為丸如梧桐子大每服五十九米飲下如腹痛煎當歸湯下下血煎地榆湯下食前服

訶梨勒丸

出楊氏家藏方

治脾胃虛弱泄瀉不止腹臍疼痛

肉苳蔻

麵裹煨香

草苳蔻

去殼

訶梨勒

煨去核已上三味各二兩

赤石脂

三兩

高良薑

三兩

乾薑

三兩已上二薑用好醋一升同

煮醋盡晒乾入別味

右為細末粳米飯為丸如梧桐子大每服五十九飲

米送下食前服

抵聖散

出楊氏家藏方

治脾胃虛弱泄瀉不止腹痛腸鳴水

穀不化不思飲食

肉苳蔻

八枚麵裹煨香

人參

去蘆頭

陳橘皮

去白

木香

白茯苓

去皮已上四味各半兩

肉桂

去粗皮一兩

附子

炮去

皮脂一兩

甘草

炙七錢半

訶子

一十六枚煨去核

右為細末每服三錢水一盞半生薑三片棗一枚煎

一盞空心食前去滓溫服

煨肝散

出楊氏家藏方

治臟腑久虛挾寒滑泄全不入食口

生白瘡

川椒

去目出汗

茴香

炒

縮砂仁

丁香

木香

肉苳蔻

麴煨香已上六味各半兩

附子

炮去皮臍

白朮

已上二味

各一兩入生薑四兩
用醋煮十數沸焙乾

右為細末每服三錢用獾猪肝或羊肝二兩切作片
子批開摻藥末在內更用好紙三兩重裹慢火煨候
肝熱取出細嚼溫酒送下

茱萸湯 治腸胃虛寒泄瀉不止

當歸

洗焙
三錢

乾薑

炮三
錢

肉桂

去粗皮
二兩

附子

炮
去

皮臍 一兩
吳茱萸 一兩湯
洗七次

右為粗末每服四錢水一盞煎七分去滓

葷撥九

治脾胃虛冷心腹疴痛腸鳴泄瀉不思飲食

人參

去蘆

胡椒

肉桂

去麝皮

訶子

煨去核已上四味各三兩

葷撥

白茯苓

去皮

乾薑

炮三味各半兩

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服五十九米飲

送下空心食前

人參散 治瀉無比

橡斗皮

四兩去子蜜炒

人參

七錢

木香

三錢

甘草

四錢

黃橘皮

半兩

訶子

四箇

藿香

三錢

右為細末煉蜜為丸如彈子大每服一粒嚼細煎艾湯下每兩作十丸將後五件同入在內亦佳立春後芒種前加白朮半兩立夏後秋分前加芍藥茯苓各三分立秋後加縮砂半兩如瘀血吐血下血加當歸半兩

治瀉斗肚丸

出十便良方

木瓜

厚朴

訶子肉

蒼朮

赤石脂

各一

兩

茯苓

二兩

附子

半兩

右為末飯丸如梧桐子大非時米飲下五十丸

木瓜煎丸

出十便良方

治瀉不止

以木瓜一箇切去蓋子入艾葉一兩椒子四十九箇
蓋定簽之入磁器內以醋好者一升煮乾去艾并椒
研木瓜為糊用和乾薑炮附子炮等分末丸如梧桐
子大每服七十九薑附末不拘多少

薑附丸

出楊氏家藏方

逐寒去濕溫脾胃止泄瀉

白朮

四兩

乾薑

二兩炮

附子

二枚七錢重者炮去皮臍

右為細末麵糊為丸如梧桐子大每服三十九食前
溫米飲下

理中丸

出澹
療方

人參

乾薑

煨

白朮

炒各
一兩

甘草

炙半
兩

右為細末煉蜜為丸如彈子大每服一九生薑湯嚼
下一方加炮熟川附子一兩如前製服治中寒嘔泄
等証名附子理中丸或如梧子大亦可食

附龍丸

出澹
療方

治男子婦人臟寒滑泄或云小兒吐瀉

亦効

附子

炮去
皮臍

伏龍肝

少用

肉苳蔻

生用

右為細末研飯為丸空心飯飲吞下每服三十五十

粒

禹餘糧丸

出同
前

主腸胃寒虛滑泄不禁

禹餘糧石

煨

赤石脂

煨

龍骨

生用

葶撥

訶

子

麵裹
煨

乾薑

炮

肉苳蔻

生用

附子

炮去
皮臍

右等分為細末醋糊為丸如梧桐子每服七十九米

飲送下食前

固腸丸

出朱氏
集驗方

治泄瀉

附子

去皮炮
切一兩

白茯苓

一兩

乾薑

炮半兩

大黃

去

打

木香

切片各
半兩

右水二碗煮乾晒為末麵糊丸每服百粒米飲下

療二十種雜下

江夏太守用此法療盡愈

出肘
後方

黃連

黃蘗

熟艾

附子

炮

乾薑

炙一兩

烏

梅

二十枚
取肉炙

乾薑

二兩

右七味各搗下蜜丸如大豆服十九漸至二十九日
三忌肥肉生冷一方無甘草附子黃連一方除甘草

附子

車前散

出危氏方

治暴瀉不止小便不通亦治水瀉

以車前子為末每服二錢米飲調根葉亦可立効昔
歐陽文忠公嘗得暴下國醫一帖甚効公曰吾輩臟
腹不與市人同不可服夫人買之國醫藥雜進一服
而愈後公知之召賣藥者厚遺之問其方久之乃肯

說云此藥利水道而不動氣水道利則清濁分穀臟
自止矣

來復丹

出仁
存方

治臟腑虛滑心腹疼痛泄瀉不止可冷

可熱可緩可急不問男婦長幼危急之証但有胃氣
無不獲安

硫黃

同硝石納入定磬內微炒用柳木篾子攪令
陰陽氣相入不可火太過忌傷藥力再研極

細名二氣末

二味各一兩

五靈脂

去砂
石

陳皮

青皮

各去
白二

兩

玄精石

一兩煨
紅酒淬

右為細末研勻用醋糊為丸如豌豆大每服三四十丸空心米煮粥飲下小兒三五粒若慢驚風吐痢不止虛風搐搦者非風也胃氣不絕故也

應夢如神如聖飲子

出家藏經驗方

治陰陽不和冷熱相感

腹痛泄瀉米穀不化及榮衛虛弱寒氣內襲下痢赤白裏急後重並宜服之

綿薑

一兩
炮製

陳橘皮

一兩半
去穢秤

木香

半兩

揀甘草

一兩
炙黃

茯苓

一兩

訶子

一兩
火炮
去核秤

御米殼

二兩
去頂

梗并子及
內隔皮炒

右吹咀每服四錢至五錢水一盞半棗二枚煎至七分去滓溫服不拘時候腹痛加乳香少許白痢加乾薑大棗兩服滓併作一服血痢加黃連木香半錢血少加烏梅一箇近日有言運幹二女病幾月母夢老僧告曰何不贖此藥既覺買服之立効

溫腎丸 治五臟寒痛小便多便泄瀉

川烏

炮

乾薑

官桂

三稜

炮

青皮

硫黃

各等分

右為末酒糊丸如梧桐子大每服三十九酒送下泄瀉乾薑湯下

白朮附子湯

出濟生方

治腸胃虛濕腸鳴泄瀉或自多汗

白朮

二兩

附子

炮

茯苓

去皮各一兩

右㕮咀每服四錢水一盞半生薑七片棗一枚煎七分去滓溫服不拘時候

斷下丸

出家藏經驗方

治泄瀉無度

枯白礬

華陰細辛

一兩半去枝葉土淨秤

訶子皮

二兩

乾薑

三兩
炒對

龍骨

去舌紫
者三兩

赤石脂

三兩
色者火煨

黑附子

炮裂去皮尖嘗不
辣方入藥秤一兩

石榴皮

用醪醕浸軟
炒令乾須用

漿石榴

皮二兩

牡礪

用鹽泥固濟火煨
通赤為度二兩

右為細末麵糊為丸如梧桐子大每服一百丸食前
濃煎陳米飲下

薑粟散

出家藏
經驗方

治暴瀉

罌粟殼

去蓋子
淨洗

甘草

陳皮

不去
穢

乾薑

右等分新瓦上炒乾薑黃色為細末每服三錢陳米

煎稠飲調下全在米濃有汁溫服有效

治氣七寶丹

出十便良方

陳橘皮

附子當歸

乾薑

各一兩

厚朴

胡椒

各半兩

舶上硫黃

一分為細末

吳茱萸

半兩

右七味以細剉用慢火暖過搥羅為末與硫黃末同

拌和一處煎米醋和作兩劑却以白麵半斤和令得

所亦分作兩劑用衆藥如燒餅法用文武火煨令麵

熟為度去却麵於臼中搥三百下九如梧桐子大如

患諸般泄痢以米湯下二十九空心日午服如患氣痛及宿食不消以薑湯下二十九並無所忌如久患瀉痢服此無不瘥効如神若老人及脾胃洩滑大宜服此藥

換腸丸

出御藥院方

治劇泄瀉不止并諸下痢之疾

御米穀

去頂蒂碎微炒淨秤二兩

木香

訶子皮

白芍藥

甘草

炒

當歸

去蘆頭炒

人參

各一兩

白茯苓

去皮

白朮

各一兩半

右以生薑絲鹽各少許拌勻紙裹水濕文武火煨熟
用生薑粥下食前日進二服

乳豆丸

出嚴氏
濟生方

治大腸虛寒滑泄不止

鍾乳粉

一兩

肉苁蓉

半兩麵裹煨
香去麴不用

右為細末煮棗肉杵和為丸如梧桐子大每服七十
丸空心食前用米飲下

薑連丸

治元臟久冷滑泄不止飲食不進漸至危困

乾薑

炮

黃連

去
鹽

赤石脂

白礬枯

龍骨

右等分為末粟米粥丸如梧桐子大每服三十九溫
米飲下日三五服不拘時

猪臟丸 治元臟久冷滑泄不止飲食不進漸至危困

硫黃

二兩
為末

猪臟

一斤淨洗入硫黃內以線縛兩
頭用米醋五升入甕瓶以鹽泥

固濟用炭火一秤煨俟
醋乾為度取出入後藥

吳茱萸

二兩
炒

厚朴

一斤

去皮

薑炒

右為末先研臟細次入藥末一處同研勻丸如梧桐
子大每服三十九空心鹽湯鹽酒下

木附湯 濕証泄瀉

白朮

二兩

甘草

炙一兩

附子

炮七錢半

右咬咀為末三錢服薑七片水煎空心溫服

薑附湯 治冷証泄瀉

附子

炮

乾薑

炮各等分

訶梨勒丸 大腸虛冷泄瀉不止腹脇引痛飲食不化

訶子

麵煨

附子

炮

肉苳菹

麵煨

木香

吳茱萸

炒

龍骨

生

白茯苓

草撥

右為細末薑煮糊丸梧桐子大每服七十九空心米飲下

茯苓湯 治濕瀉

白朮

一兩

茯苓

去皮七錢半

右㕮咀水煎一兩食前服食入而瀉謂胃中有宿穀也當枳實五錢酒入而瀉濕熱瀉也加黃芩五錢

硃砂丸 無問大人小兒或上格吐逆下注泄瀉不止

枯白礬 黃丹

各等分

硃砂

為衣

右為細末棗肉為丸如大豆大每服三四丸以針扎藥丸燈上燒熟妍爛涼米泔水調下瀉者食前吐者無時候

平胃散 治傷濕泄瀉

橘紅 厚朴

製各三兩半

蒼朮

炒五兩半

甘草

炙一兩

右剉細每服三錢薑棗煎服

又方 以生料五苓散對夾平胃散用陳米煎暑瀉食瀉諸証皆効

益胃湯 治頭疼悶勞動則微痛不喜飲食四肢怠惰
燥熱短氣口不知味腹鳴大便微溏黃色身體昏悶
覺渴不喜冷物

黃耆

二分

人參

三分

甘草

二分

黃芩

三分

蒼朮

一錢

半

陳皮

五分

當歸稍

三分

升麻

半錢

柴胡

二分

紅花

少許

半夏

三分

益智

二分

白朮

三分

右都作一服水二盞煎至一盞去滓稍熱服之食前
一婦人年四十餘歲因內傷服藥犯牽牛大黃食藥

致泄痢五七行以升陽補胃治之

和胃湯

升麻

半錢

柴胡

半錢

當歸身

二錢

草薢

半錢

半

夏

三分

乾薑

七分

甘草

七分

紅花

七分

黃耆

半錢

右都作一服水二盞煎至一盞去滓稍熱服兩飯間

飲之

溫中湯 治老人吐瀉不止

揀參

白朮

白茯苓

乾薑

炮各一分

右為細末每服二錢鹽湯米飲調服空心食前蓋乾薑溫中茯苓利水平三焦也

癸卯歲冬十月小雪薄冰天令應時白樞判家一老僕面塵脫色神氣特弱病脫肛日久服藥未効近日復下赤白膿痢作裏急後重白多赤少不勝任其苦先師料曰此非肉食膏粱必多蔬食或飲食不節天氣應時衣蓋猶薄寒侵形體乃寒滑氣泄不固故形質下脫也當以澁去其脫而除其滑微酸之氣固氣上收去其下脫

以大熱之劑除寒補陽以補氣之藥升陽益氣是的對其証

訶子皮散 治腸胃虛寒泄瀉米穀不化腸鳴腹痛脫肛或作膿血日夜無度

粟殼

去蒂菴蜜炒半錢

訶子

去核七分煨

乾薑

炮六分

橘

皮

半錢

本草十劑云澁可去脫以粟殼之酸微澁上收固氣去脫主用為君也以訶子皮之微酸上收固血治其

形脫橘皮微苦溫益真氣升陽為之使以乾薑大辛
熱之劑除寒為臣

右為細末分作二服二盞水煎至一盞和滓熱空心
再服全愈

扶脾丸 治脾胃虛寒腹中痛溏瀉無度飲食不化

白朮

茯苓

橘皮

各二錢

大麥蘖

四錢半

炙甘草

草

三錢

肉桂

半錢

半夏

二錢

乾生薑

半錢

訶子皮

二錢

紅豆

一錢

乾薑

一錢

炒麴

四錢

藿香

一錢

烏

梅二錢

右為細末以荷葉燒飯為丸如梧桐子大每服五十

丸食前溫水下

黃耆補胃湯 治一日大便三四次澹而不多或作泄

腹中鳴小便黃

黃耆

分二

炙甘草

錢二

升麻

分六

橘皮

分三

當歸

身

分三

益智

分三

柴胡

分三

紅花

許少

右咬咀分作二服水二大盞煎至一盞去滓稍熱服

食前

升陽除濕湯 自上而下引而去之

升麻

錢半

柴胡

錢半

羌活

錢半

蒼朮

錢一

炙甘草

三分

神麴

錢半

猪苓

錢半

陳皮

三分

大麥蘖麴

錢三分

防風

錢半

澤瀉

錢半

如胃寒腸鳴加益智仁

錢半

半夏

錢半

生薑棗同煎非腸鳴不得用

右都作一服水二盞煎至一盞去滓早飯後稍熱服

煮朴丸 治脾胃不足停寒留飲泄瀉無時

厚朴

一斤
製

天南星

去皮
四兩

肉棗

去核五
十箇

生薑

一斤半和皮洗切作
片入大蒜十枚同煮

已上用水五升同煮上四味於銀器中煮令乾畧炒
薑不用却後入藥

乾薑

炮

茴香

炒各
四兩

青鹽

一兩
煨

甘草

一兩半
同煎藥

煮乾去
草不用

附子

炮

川椒

揀去閉口
并目炒

白茯苓

各
一兩

右為細末神麴糊為丸如梧桐子大每服五十丸加至

七十九空心米飲下

桂香丸 治臟腑寒為風濕寒所搏冷滑注下不禁老

人虛人危篤累効

附子

炮去皮臍

肉苳菹

白茯苓

各一兩

桂心 白

薑

炮

木香

炮各半兩

丁香

一分

右為末糊丸如梧桐子大米飲下空心服

金鎖丹

治寒冷滑泄

右以辰砂一兩研令極細以水丸作一錢放乾次用

陽起石一兩研令細以水和作餅褙前砂放乾復用
龍齒一兩作末水和作餅褙前藥復用牡蠣一兩作
細末以水和作餅褙前藥令乾外用六一泥固濟作毬
直待透乾方用醋灰半斗許圍之五斤炭煨先下三
斤後將盡再下二斤火盡俟冷打開去泥并牡蠣存
留三件一處研令極細以棗肉丸如梧桐子大空心
鹽湯下三五九大固真丸纔覺固則休服及治臟腑
滑泄以米湯下五粒婦人宮血不調米湯下三五粒

丈夫諸般虛僊証亦不過三五粒功效非常藥比也
煨肝散 治脾元虛冷滑泄不止口内生瘡腹中冷不
思飲食暖胃消食止瀉

蒼朮

三兩

縮砂

去皮

柴胡

去苗

桔梗

厚朴

薑汁炙去

皮各一兩

蕪荑

三分

桂心

三分去皮

陳橘

去穢

遠志

去心

北紫苑

各半兩

胡椒

一分

右件杵為末以細絹篩為散每服獐猪肝四兩切作
三斤每片用末一大錢七摻於肝上入葱白蒔蘿鹽

等全有滋味一重布麵片裹之搪灰火內煨令通熟
麵焦黃色即得去麵取肝空腹服其麵可二分已來
或細切作片以散拌如皂角子如常炒熟食亦得薄
米飲下忌生冷

益智大煮散 治脾腎風虛脾元冷憊虛滑不止飲食
全退

青木香

半
分

舶上茴香

一
分

青橘

一
兩

乾薑

半
兩

烏梅

二兩
生用

益智

一兩
生用

右為末每服二錢水二盞棗五枚同煎至八分先喫
棗後服藥食前服之過熱不妨

小草還丹 補脾腎虛冷止大腸滑洩

地黄

半斤剉炒黃色

茱萸 青橘皮

去白

草薢 乾薑

石榴皮

各炙二兩

厚朴

一兩薑汁炙令黃香為度

右為末醋糊為丸如梧桐子大每服空心米飲下三
十丸或嚼破生薑米飲下

滲腸丸

出楊氏家藏方

治泄瀉不止久痢不差 不問赤白膿

血並皆治之

附子

炮去
皮臍

阿膠

蛤粉
炒

白米

訶子

煨去
核

白

龍骨

赤石脂

乾薑

炒上各
等分

右為細末煮麴糊為丸如梧桐子大每服五七十九
溫米飲空心下

治脾瀉蓋脾惡濕濕則濡弱而困困則不能制水經曰

濕勝則瀉

又本
草方

以生薑碎之半夏湯洗與大棗各三十枚水一升瓷

瓶中慢火燒為熟水時呷數口便已今人惟知半夏
去痰不言益脾蓋能分水故也昔有一男子夜數廁
或教以此方服遂愈

治久患脾泄瀉臟腑虛滑不進飲食

右用青州大棗子去核以木香劈破如棗核大置棗
中十數枚以水一盞煮俟軟熟溫嚼喫以所煮汁送
下甚者不過一二劑

水瀉

附論

夫脾與胃為表裏脾主消於水穀胃為水穀之海其精氣
化為氣血以養臟腑其糟粕傳於大腸也若脾胃虛弱
受於寒氣或飲食生冷傷於脾胃水穀不消大腸虛寒
故成水瀉也 內經謂諸厥洞泄皆屬於寒暴注下迫
皆屬於熱蓋為冷熱不調氣不相濟也脾胃怯弱水穀
不分濕飲留滯水走腸間禁固不能故令人腹脹下痢
有如注水之狀謂之注泄世為水瀉

訶梨勒九

出聖濟
總錄

治水瀉吐穢徧身疼痛

訶梨勒

煨去核

鹿茸

酥炙去毛

桑根白皮

剉

地榆

赤石脂

天雄

炮製去皮臍

龍骨

各一兩半

白芷

黃連

去鬚

桂

去粗皮

白茅根

厚朴

去粗皮塗生薑汁炙

當歸

切焙各一兩

黃芩

去黑心

乾薑

炮裂各半兩

肉苳

薏

去殼四枚

右為末爛飯丸如梧桐子每服三十九溫米飲下

白芷黃連湯 治因傷水飲後變成暴泄

白芷

一兩半

黃連

去鬚一兩

地榆

一兩半

當歸

剉焙一兩

木香

一兩

赤石脂

一兩

黃芩

去黑心
半兩

芎藭

一兩

訶梨勒皮

煨一兩

肉苳菴

一枚煨
去散

白朮

一兩

附子

炮製去皮
臍一兩半

桂心

去粗皮
一兩

右判如麻豆大每服五錢水一盞半入生薑四伍片煎至八分去滓空心溫服日三

正氣散

出聖濟
總錄

治水瀉日夜不止

縮砂蜜

去皮

附子

炮製去
皮臍

赤石脂

肉苳菴

去殼

龍骨

石榴皮

焙

甘草

炙

人參

地榆

白朮

吳茱萸

湯浸焙
炒乾

乾薑

炮各
一兩

右為散每服三錢煮粳米飲調下不拘時以止為度

赤石脂丸

出聖
患方

治水瀉心腹痼痛四肢逆冷不納飲

食

赤石脂

三兩

龍骨

二兩

艾葉

一兩
微炒

附子

一兩
炮裂去皮

臍

肉苁蓉

一兩
去殼

縮砂

一兩
去皮

高良薑

一兩
剉

乾薑

一兩
炮裂剉

吳茱萸

半兩
湯浸七次焙乾微炒

厚朴

一兩
去粗

皮塗生薑汁

炙令香熟

石拙羅為末以醋煮麵糊和丸如梧桐子大每服不計時候以粥飲下三十丸

大道固腸丸

出御院藥方

治腸虛滑泄水穀直下完穀不化

久寒積冷心腹脹滿不思飲食怠惰嗜卧困倦少力
兼治白帶脉候沉微

肉苳蔻

醋麵裹燒熟為度

硫黃

火飛

赤石脂

燒紅

白礬

枯陽起石

燒一日各一兩

乾薑

炮

川烏豆

炮去皮臍各一

兩半縮砂仁

木香

各半兩

白龍骨

二兩半

石件研為細末醋麵糊為丸如梧桐子大每服五七
十九空心粥飲下

木香丸 治脾胃虛冷腸滑水瀉如休息痢不止

木香 白堊

煨火

肉苳蔻仁

丁香

各半兩

乾薑

炮

訶梨勒

煨取皮

龍骨

各一兩

黃連

去鬚三兩

右為末煉蜜丸如桐子大每服三十丸空心米飲下日
晚再服

治水瀉米穀不化晝夜不止

出聖濟總錄

取黃荊葉不限多少陰乾搥羅為散每以米飲調下

又方

出聖濟總錄

取羊蹄根晒乾刮去皮搥為末每服以

米飲調下三錢

又方

出聖濟總錄

取乾艾半斤慢火炒令熱布裹坐之冷

再炒坐

香連散

出聖惠方

治水瀉時有腹痛

木香

半兩

黃連

三分去鬚微炒

縮砂

三分去皮

當歸

三分剉微

炒

龍骨

一兩

訶梨勒

三分煨用皮

厚朴

二兩去粗皮塗生薑

汁炙令

香熟

莨菪子

一兩水淘去浮者水煮令芽出晒乾炒令黃黑色者

右搗細羅為散每服不計時候以粥飲調下二錢

燕萆丸

出聖濟總錄

治水瀉

燕萆

炒

黃連

去鬚炒

吳茱萸

湯洗焙炒各三兩

乾薑

炮一兩

枳殼

去穰麵炒半兩

縮砂蜜

二兩

右為末煮漿水飯九梧桐子大每服二十丸溫米飲

湯下

漿水散

出深命集

治暴泄如水週身汗出身上盡冷脉微

而弱氣少不能語甚者加吐此謂急病

半夏

二兩
湯洗

附子

半兩
炮

乾生薑

甘草

炙

桂

各五
錢

良薑

二錢
半

右為細末每服三五錢水二盞煎至一盞和滓熱服
甚者三四服微者三服太陽經動下痢為驚澹大腸
不能禁固卒然而下痢成小漆光色其中或有硬物
欲起而又下欲了又不了又便多清此寒也宜溫之
春夏桂枝湯

縮砂丸

出聖惠方

治冷氣水瀉日夜二三十行腹中疝痛

四肢不和

縮砂

一兩去皮

黃連

一兩去鬚微炒

附子

一兩炮裂去皮臍

乾

薑

半兩剉炮裂

木香

吳茱萸

一兩湯浸七遍焙乾微炒

右為末用醋炊飯和丸如梧桐子大每服不計時候以粥飲下三十丸

木香散

出聖濟總錄

治水瀉不止

青木香

黃連

去鬚炒各一兩

訶勒皮

微炒三分

龍骨

半兩

厚朴

去粗皮生薑汁炙令紫剉三分

右為散每服三錢空心以粥飲調下日午再服以差

為度小兒以加減服之

厚朴散

出聖濟總錄

治一切水瀉及冷痢

厚朴

去粗皮生薑汁炙冷紫剉一兩

乾薑

半生半炮裂一兩

白朮

一兩

陳橘皮

湯浸去白焙三分

甘草

半生半炙半兩

右為散每服三錢空心米飲調下如霍亂吐瀉新汲

水調下日晚再服

木香丸

出聖濟總錄

治水瀉不止

木香

錢一

草烏

生去皮臍半兩

肉苳蔻

一枚大者去殼

胡粉

半兩研

巴豆

大者七枚去皮心膜出油盡研

右為細末合研勻糯米飯和丸如黍米大每服三九

小兒一丸並用冷菜菔湯下

龍骨散

出聖惠方

治水瀉腹痛不納飲食

龍骨

一兩

木香

一兩

當歸

一兩對微炒

肉苳蔻

一兩麝

煨令麝黃為度

厚朴

二兩去粗皮

右搗細羅為散每服二錢粥飲下日三四服

代赭丸

出聖濟
總錄

治水瀉腸鳴臍腹撮痛

代赭

煨
赤

乾薑

炮

龍骨

各一
兩

附子

炮裂去
皮臍

右為末研軟飯和丸桐子大每服三十丸空心米飲

下日午再服

礞砂丸

治水瀉不止

礞砂

研

石硫黃

研各
一兩

鉛丹

研半
兩

巴豆

去皮
心出

油盡十

四枚

右先用巴豆霜研細入諸藥同研細用糯米飯為丸如小豆大水瀉新汲水下一丸赤白痢煎乾薑甘草湯放冷下一丸吐瀉煎生薑木瓜湯放冷下一丸不拘時服

杏仁丸 治水瀉

杏仁

湯煎去雙仁皮尖七粒

砒霜

末

巴豆

霜

鐺墨

各一

錢

右研棗肉九粟米大臨卧新汲水下一丸

如聖丸

出聖濟
總錄

治水瀉滑腸氣虛久冷

乾薑

炮

高良薑

胡椒

蜀椒

去目并
閉口者

右等分為末醋煮麵糊為丸桐子大每服三十九空

心食前粥飲下

訶梨勒丸

治水瀉腸滑不禁

訶梨勒

二兩麵裹煨去核
取皮并麵為末

乾薑

炮

赤石脂

龍骨

各一
兩

右為末稀麵糊丸如梧桐子大每服二十九空心米

飲下

訶梨勒丸 治水瀉

取訶梨勒不拘多少麵裹灰火炮令赤黃剝去皮麵
取訶梨勒皮搗羅為末軟飯和丸梧桐子大每服三
十九米飲下空心食前服

治水瀉

南木香 縮砂仁 白朮

各一兩

丁香

半兩

右剉如麻子大每服三四錢水一盞半煎七分食前

通口服輕者三四服重者六七服

虛冷人加附子半兩

厚朴丸 治水瀉

厚朴

三兩去粗皮塗生薑汁炙令香熟

黃連

去鬚一兩微炒

木香

一兩

乾薑

炮裂判一兩

右為末醋煮麵糊丸如梧桐子大每服三十丸不計時候以冷水飲下

肉苳菟散 治水瀉腹痛腸鳴

肉苳菟

去殼為末一兩

生薑

汁二兩

白麵

二兩

右將薑汁和麵作餅子裹荳蔻末煨令黃熟研為細末每服二錢空心米飲調下日午再服

斗門散 治暴瀉日夜無度

橡斗子

去刺

訶梨勒

煨去核

黃連

去積

右等分搗羅為散每服一錢米飲調下食前服

立効丸 治水瀉不止

鉛丹

炒半錢

草烏頭

一枚炮裂去皮臍

巴豆

三粒去皮心膜出油

碎 盡

右先搗烏頭為末與二味研極勻以糊丸如茱萸大
每服一九煎陳粟甘草烏梅湯放溫冷下

黑神丸 治水瀉不止

巴豆

一枚去皮心
膜不出油

杏仁

七枚去雙
仁皮尖炒

錙墨

一錢

右研極細以糯米粥丸秫米大每服一九冷水下立
止甚者再一九

針頭丸

治水瀉腸鳴及積痢

一名砂丸

巴豆

一枚去
皮膜

杏仁

一枚去皮尖二味皆
針挑上火燎存性

右細研約三百轉入大豆末一字再研一百轉麵糊和丸如針頭大每服一九新汲水下一方以蒸棗肉為丸芥子大硃砂為衣倒流水下一丸食前服

白堊丸 治水瀉米穀不化晝夜不止

白堊

一兩煨
煨過

乾薑

炮一兩

楮葉

二兩生
研細

右研為末米糊和丸如菉豆大空心米飲下二十九黃蠟丸 治水瀉不止傷冷虛極

用硫黃一兩研細先用黃蠟鎔化却入硫黃末和勻丸

如梧桐子大每服五丸新汲水下

備急朝真丹 治氣虛傷冷暴作水瀉日夜二三十行

腹痛不止并夏月路行

硫黃

二兩

牛角

研令極細

枯白礬

半兩

右同細研水浸蒸餅去水脉和丸如桐子大硃砂為衣每服十五丸溫米飲鹽湯下

如聖丸 治水瀉赤白痢

烏頭

端正大者炮裂去皮臍

萊菔

右為末新水和丸棗豆大以丹砂為衣每服五九白
痢乾薑湯下赤痢甘草湯下赤白痢煎乾薑甘草湯
下水瀉用新汲水下小兒一二九不拘時服

硫黃丸 治水瀉不止腹臍久冷不思飲食

硫黃

一兩

白礬

三兩燒
令汁盡

右都細研為丸以粳米飯和丸每服十丸不計時候
以粥飲下

硫黃散 治暴瀉所下如破水

生硫黃 白滑石

各等分

右為末溫水調下立止

乾棗方 治水瀉

用青州乾棗十枚去核入葦若子填滿以麻纏却用炭火燒令烟盡研細每服一錢半煎陳粟米飲調下治水瀉多時不瘥

取殺羊角一枚用白礬末填滿燒為灰研為散每食前新水調下二錢

計頭丸

出危氏方

治夏水瀉不止

以大巴豆一粒去殼針刺定燈上燒存性研細用蠟如小豆大蘸亦以燈上炙令鎔丸巴豆灰作一九倒流水吞服食前一服効

治水瀉無度

用乾薑末粥飲調下立効

治暴水瀉不止

出海上方

用肉苳菹三箇用濕麵裹定慢火內煨令麵焦去麵

研為末只作一服陳米飲調下食前服之神効

治水瀉

用生薑一塊連皮切作二片入明礬一銅錢合定紙包小打溫火煨熟沸湯井水合一盞嚼爛薑湯送下一方服理中湯加肉苳菴良薑水一盞半薑三片煎至七分食前服之

肚蒜丸

出危氏方

治水瀉丁必卿云渠每遇五更必水瀉

一次百藥無効服此遂安

用獾猪肚一枚淨洗去脂膜入大蒜在內肚滿為度
自晨至晚肚蒜糜爛為度杵成膏子入平胃散同杵
丸桐子大每服三十九鹽湯或米飲空腹服

玉霜丸

一名縛虎丸
出聖濟總錄

治水瀉小腹疼痛

方見本門
休息類

茱萸丸

一名茱
萸湯

治水瀉不止

治一切男婦驟然水瀉日夜不止命欲臨死宜服此方

小兒服半錢

出護
命方

麻葉

五月五日採陰乾乃
令人用作市者麻

右杵細羅為末每服二錢冷水半盞調下空心服不
要吃熱物令人閃倒只吃冷涼物也若大人病重者
服二錢半此方亦治白痢大効

梅棗湯

出護
命方

治水瀉不止

棗子

大者
十枚

罌粟殼

烏梅肉

十箇

右剉為粗末每服二錢以水一盞煎七分去滓溫服
不拘時候

治水瀉并赤白痢

出十便
良方

草烏

大者一兩半

右將一半燒灰一半生用為末醋糊為丸如葉荳大每服七丸赤痢甘草湯下白痢乾薑湯下水瀉井花水下並空心服忌腥臊熱膩生冷之物

針頭丸

出楊氏家藏

治水瀉積痢

杏仁

四十枚去皮尖燒留性

巴豆

四十枚去殼燒存性

草烏頭

二錢

燒留性

百草霜

四錢

右為細末酒煮蠟一兩和丸芥子大每服五丸小兒

三九赤痢甘草湯下白痢乾薑湯下赤白痢甘草乾

薑湯下水瀉米飲下食前服

茯苓湯

試驗方

治因傷冷飯水泄一夜約走十行變作

白痢次日其痢赤白腹中痞痛減食熱燥四體困倦

無力以動

茯苓

六分

澤瀉

一錢

當歸身

四分

蒼朮

二分

生薑

二錢

肉桂

五分

猪苓

六分

甘草

半錢炙

升麻

二錢

芍藥

一錢半

黃芩

三分生用

柴胡

二分

右吹咀分作二服每服水二大盞煎至一盞去滓稍熱服食前

治水瀉腸虛煩熱

出本草方

以林擒實生食之

殮泄

附論

夫內經曰清氣在下則生殮泄又曰久風為殮泄夫脾胃土也其氣冲和以化為事今清濁交錯風邪之氣得以干胃故冲氣不能化而食物完出夕食謂之殮以食之難化者尤在於夕故食不化而泄出則謂之殮泄此俗

所謂水穀痢也 脾胃交濟所以有水穀之分脾氣雖強而胃氣不足故飲食下咽而大腑之殞泄也治法用二神丸破故紙肉苁蓉修合或不換金正氣散吞安腎丸主之蓋脾胃之氣交通則水穀自然尅化此所謂妙合而凝者也

紅豆丸

出瑞竹堂

治臟腑泄瀉名為殞泄

麥蘖

炒

半夏

湯洗七次

砂仁

神麴

各一兩半炒

礪

砂

醋化

甘草

青皮

去穰

陳皮

鬱金

紅豆

藿香 棠球

炒

蓬朮

兩 各三

良薑

單撥

二 各

兩

丁香

半兩 不見火

右為末水煮麵糊為丸如梧桐子大每服一百丸或
隨物空心下病甚者日進三服

桂心丸

出聖濟
總錄

治脾胃氣虛飧泄不止飲食不消雷

鳴腹內疔痛

桂

去粗皮

赤茯苓

去黑皮

赤石脂

各三兩

黃連

去賢

一兩

麥蘖

炒

神麴

炒

石斛

去根

乾薑

人參

當歸

切焙

附子

炮裂去皮臍去

蜀椒

去目并閉口炒出汗

龍

骨

各半兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服三十九空心煖酒

下日午再服

高良薑湯

出聖濟總錄

治脾胃受氣久為飧泄下痢嘔逆

腹內疝痛

高良薑

木香

赤茯苓

去黑皮

檳榔

剉

人參

各三

肉苳菹

去殼

吳茱萸

湯浸焙炒

陳橘皮

湯浸去白

炒各
半兩

乾薑
炮一分

縮砂蜜
去皮半兩

右搗篩每服四錢水一盞半煎八分去滓不拘時日

三服

乾薑丸

出聖濟
總錄

治殮泄色白食不消化

乾薑
炮

黃連
去鬚炒各
一兩半

右為末先以酒一升微火煎候可丸即丸如桐子大

空心米飲下三十九日午再服一方治氣痢瀉裏急

後重為末空心酒調服

萆撥散

出聖濟總錄

治飧泄氣脹滿不下食

萆撥

三兩

肉苳菹

去殼半生半煨一兩

乾薑

炮半兩

白朮

三分

甘草

半生半炙判半兩

木香

半生半炒一兩

訶梨勒

半生

半炮去核一兩

右為散每服二錢空心米飲調下日晚再服

木香散

出聖濟總錄

治腸胃冷氣飧泄不止

木香

阿膠

炙燥

訶梨勒

炮去核

黃連

去鬚炒半兩

乾薑

炮

吳茱萸

湯浸焙炒

龍骨

各一分

右為散每服三錢空心米飲調下日晚再服

地榆湯

出聖濟總錄

治腸胃受氣飧泄無度或下黃水腹

脇痛悶

地榆 厚朴

去粗皮生薑汁炙

當歸

切焙各三分

艾葉

炒

吳茱萸

湯浸炒

高良薑

各半兩

右搗羅每服四錢水一盞半煎八分去滓空心日午

溫服

薑米散

出聖濟總錄

治脾胃氣虛腹脹飧泄困劣煖藥即

嘔逆食飲不下

陳米

一升用生薑二斤取汁浸米焙搗篩為末炒令黃

草荳蔻

十枚煨去皮

甘草

剉炙

肉荳蔻

十枚去殼

陳橘

去白炒

燒鹽

各一

兩研

右研散每服二錢沸湯點服不拘時候

鷄舌香散

出直指方

治殮生冷久為冷積

良薑

辣桂

香附

淨洗

天台烏藥

益智仁

各一

兩

甘草

炙半兩

右為末每服二錢入炒鹽沸湯點吞感應丸

白朮湯

出宣明論

治風冷入中飧泄不止脉虛而細日夜

數行口舌乾燥肚腹疼痛飧洩症主冷清氣在下則生飧洩清濁交錯食不化而清穀矣

白朮 厚朴

去粗皮生薑汁炙

當歸

切焙

龍骨

各一兩

熟艾

炒各半兩

右搗篩每服四錢水一盞入薑兩片同煎七分去滓空心日晚溫服

乾薑丸

出聖濟
總錄

治腸胃風冷飧泄注下腹痛不止

乾薑

炮

厚朴

去粗皮
薑汁炙

當歸

切焙各
三分

阿膠

炙
燥

龍骨

各一
兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服三十九空心棗湯

下

荳蔻散

出聖濟
總錄

治飧泄水穀不分溫脾止腹痛進食

草荳蔻

去
皮

乾薑

甘草

陳橘皮

湯浸
去白

高良

薑

右等分剉碎都作一處用胡餅剉裹溘灰內炮令黃熟取出麵搗為散每服二錢陳米飲調下食前服

茯苓湯

出聖濟總錄

治飧泄米穀完出

赤茯苓

去黑皮

黃連

去鬚炒

厚朴

去粗皮生薑汁炙各一兩

乾薑

炮半兩

右搗篩每服四錢水一盞半煎分去滓空心日午溫

服

治飧泄滑痢不止

一名茯苓木香
出百一選方

白茯苓

二兩

南木香

半兩紙裹炮

右為末紫蘇木瓜煎湯調二錢

茱萸湯

出聖惠方

治飧泄米穀不化及諸色痢亦治水瀉

不止

吳茱萸

湯浸焙乾炒

黃連

去鬚炒等分

右搗篩每服四錢水一盞半煎八分去滓空心溫服
不止再服一方飯和丸粥飲下三十丸

防風芍藥湯 治泄痢飧泄身熱脉弦腹痛而及頭痛

微汗

方見本門諸泄痢類

法云瀉有虛實寒熱虛則無力粘衣

不便已泄出謂不能禁固也實則數至圜而不能便

俗云虛坐努瀆是也裏急後重皆依前法進退大承

氣湯主之一說素問云春傷於風夏飧泄又至久風

為飧泄泄者乃水穀不化而完出非水入胃而成此

証非前水恣也此一証不飲水而穀完出名飧泄治

法于後先以宣風散導之出錢氏方中四味者是也

後服

蒼朮防風湯

蒼朮

去皮
四兩

麻黃

去根節
四兩

防風

去蘆頭
五錢

右為麤末每服一兩生薑七片水二盞煎一盞去滓
溫服泄止后椒朮丸

椒朮丸

蒼朮

二兩

小椒

一兩去
目炒

右為細末醋糊丸如桐子大每服二三十丸食前溫
水下一法惡痢久不愈者彌佳如小兒病丸如黍米

大

木香散 內經曰清氣在下坐生飧泄又曰久風入中則為腸氣飧泄夫脾胃土也其氣沖和以化為事今清氣下降不升則風邪久而干胃是木賊土也故沖和之氣不能化令物完出謂之飧泄或飲食太過腸胃所致亦致水穀不化此俗呼水穀痢也法當下舉而消尅之以加減木香散主之

木香 良薑 升麻

去黑腐

檳榔

人參

各七錢半

肉苁蓉

煨

吳茱萸湯

洗

陳皮

砂仁

各半錢

陳


麴

炒二錢

乾薑

洗去灰炒半錢

右為末每服四錢水一盞半煎一盞去滓溫服食前



普濟方卷二百八